



ไซแอมบิวทาคลอร์

ชื่อสามัญ บิวทาคลอร์+เซฟเฟนเนอร์

สูตรผสม 80 EC

คุณสมบัติ

- เป็นสารควบคุมการงอกของวัชพืช
- ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนภายในวัชพืช

ประโยชน์

- ควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกกหลายชนิดในนาข้าว

การใช้และอัตราการใช้

- ในนาหว่านน้ำตม

ใช้อัตรา 200 ซีซีผสมน้ำ 40-80 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 1-4 วัน เมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้ว จึงทยอยไยน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าวแต่ละวัน อย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว หรืออาจพ่นก่อนหว่านข้าวงอก 3-4 วันก็ได้

- ในนาดำ

ใช้อัตรา 250 ซีซีผสมน้ำ 40-80 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายใน 4-7 วันหลังปักดำแล้ว ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด แล้วจึงค่อยๆ ระบายน้ำเข้านาอีกครั้งภายหลังพ่น สูงประมาณ 1-2 นิ้ว โดยรักษาระดับน้ำไว้อย่างน้อย 2 วัน

- นาหยอด-ข้าวไร่

ใช้อัตรา 400 ซีซี ผสมน้ำ 40-80 ลิตร พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายหลังหยอด (ก่อนที่วัชพืชจะงอก)

